Különnyomás a „Magyar Botanikai Lapok“ 1910. évi 5/9. számából.
Separatabdruck aus den „Ungarischen Botan. Blätter“ Jahrg. 1910. Nr. 5/9.

Adatok Turóczvármegye flórájához.

Beiträge zur Kenntnis der Flora des Komitates Turócz.

Irta: Von: **Margittai Antal.** (Znióváralja.)

1904. óta tanulmányoztam a Kis-Fátra turóczmegyei részének flóráját. Öt év alatt számtalan botanikai kirándulást végeztem a Kis-Fátra és a megye különböző részeibe s ezen idő alatt vagy 700 fajt gyűjtöttem. Gyűjtésem eredményeit összehasonlítottam Wagner János kartársam «Turócz vármegye edényes növényei» cz. munkájában felsorolt adatokkal s eme összehasonlításból származnak az alább felsorolt adataim, melyek részint az illető helyekre nézve, részint pedig az egész megyére nézve újak. Adataim között vannak olyanok is, a melyek az eddigi kétes fajok előfordulását is megerősítik.

Equisetum Telmateja Ehrh. A Szlováni-völgyben, a kénes forrás körül. Uj adat.

Equisetum variegatum Schleich. Znióváralja mellett, a Studinec patak mentén. Uj adat.

Potamogeton natans L. Znióváralján a Hastavakban. Uj adat.

Potamogeton pusillus L. Znióváralja mellett, a Vedzser tóba ömlő csermelyben.

Triglochin palustre L. Tótpróna, Kelemenfalva és Rákó-Pribócz körül.

Phalaris arundinacea L. Turóczszentmárton és Znióváralja környékén, árkok mentén. Uj adat.

Phleum alpinum L. Nemcsak a Kis-Kriván hegycsoportban terem, hanem a Veterna-Hola 1000 m.-nél magasabb helyein is közönséges.

Eragrosits poaeoides Beauv. A Jankova tetején, Znióváralja mellett. Uj adat.

Lolium temulentum var. α macrochaeton A. Br. Dubova környékén, lenföldeken. Uj adat.

Eriophorum vaginatum L. Bohatsch és Wagner a Kis-Kriván hegycsoportról említik, terem azonban a Velka-Lukán és a Mincsolon is, a Veterna-Holában.

Carex leporina L. A Mincsol és a Velka-Luka csúcsokon, a Veterna-Holában.

Carex vulgaris Fries. Uj termőhelye Valcsa és Rákó-Pribócz.

Carex tomentosa L. Gyéren Znióváralján, a Szlováni völgybe vezető út mentén és a Gajdeli hágón. Uj adat.

Carex ornithopoda Willd. A Vriczkói-völgyben árnyékos helyeken. Uj adat.

Carex pallescens L. Wagner János Budisról említi, nő a Velka-Luka alatt, Valcsán is.

Carex flava L. A Valcsai-völgyben, a Velka-Luka alatt.
Carex distans L. Nő Znióváralja mellett, a Vedzser tónál, Ábrahámfalván és a Vriczkói-völgyben.
Carex hirta L. A Gagyeri-völgyben, a Blatnicza patak mentén és a Vriczkói-völgyben.
Arum maculatum L. Gyéren terem a Jankova oldalán, Znióváralja mellett és a Szlováni-völgyben.
Juncus conglomeratus L. Turóczszentmárton és Rákó-Pribócz között a vasuti árokban, Szucsány környékén. Uj adat.
Veratrum Lobelianum Bernh. Znióváralján, a Jankován és Vriczkó mellett, a Klakon. Uj adat.
Colchicum vernale Hoffm. Znióváralja körüli réteken. Ritka. Uj adat.
Crocus Heuffelianus Herb. A Velka-Lukán seregesen nő 1400—1500 m. magasságban s május vége felé virít.
Iris Pseudacorus L. Turóczszentmárton és Ruttka között a vasuti árokban. Uj adat.
Orchis militaris L. (*lusus albiflorus* Asch.) Csak Lezsiacho mellett, az erdő szélén találtam néhány példányt. Uj adat.
Orchis Morio L. Biztosan előfordul a megyében és pedig a Valcsa patak és a Szlován patak körüli réteken.
Goodyera repens R. Br. Znióváralja mellett, a Jankova keleti és északi oldalán gyéren.
Polygonum viviparum L. A Kis-Kriván csúcson bőven 1700 m. magasságban.
Sagina Linnaei Presl. A Klakon, Vriczkó mellett.
Aconitum variegatum L. *var. angustilobum* Sér. A Várhegyen Znióváralja mellett.
Ranunculus Flammula L. Nedves réteken Turóczszentmárton és Rákó-Pribócz között.
Drosera rotundifolia L. A Kis-Kriván alatti réteken Turán fölött seregesen terem.
Sedum atratum L. A Koncsita nyugati lejtőjén, körülbelül 1600 m. magasságban, egy különálló sziklán tömegesen terem. Uj adat.
Saxifraga adscendens L. A Kis-Kriván csúcs és a Koncsita közti hegygerinczen szálankint.
Ribes alpinum L. A Klak (Vriczkó mellett) északnyugati lejtőjén néhány bokor tenyészik.
Trifolium incarnatum L. Szlován és Znióváralja körül. Uj adat.
Trifolium ochroleucum L. A dubovai erdő szélén elterülő réteken gyéren. Uj adat.
Hedysarum obscurum L. Vitkay a Stochról az *Astragalus alpinus* L-et emliti, Wagner János azonban előfordulását kétségesnek tartotta, amennyiben a Stochon nem találta meg. 1909 julius 22-én megmásztam a Stochot és az egész Kriván-csoportot, hogy az *Astragalus alpinus* L. előfordulását eldöntsem. Azonban nem találtam más, ehhez némileg hasonló pillangós virágú növényt, mint a *Hedysarum obscurum* L.-t s valószinünek

tartom, hogy Vitkay is tévedett s az ő *Astragalus alpinus* L.-je szintén *Hedysarum obscurum* L. Terem a Stochon és a Kis-Kriván csúcs keleti lejtőjén 1500 m. magasságban. Uj adat.

Onobrychis sativa Lam. Ábrahámfalva, Pribócz és Turóczszentmárton körül.

Lathyrus silvester L. A Szlováni-völgyben a kénes forrás körül.

Lathyrus sativus L. Zniováralján, Valcsán, Turóczszentmárton s a megye más helyein is elvadultan terem a vetések között. Uj adat.

Linum extraaxillare Kit. A Koncsita nyugati lejtőjén gyéren.

Passerina annua Wickstr. Gyéren Zniováralján a Kalvária alatt. Uj adat.

Epilobium rosmarinifolium Hänke. Turóczszentmárton és Rákó-Pribócz között, a vasuti árokban. Uj adat.

Epilobium trigonum Schrank. A Belli patak mentén, a Kriván-Fátra hegycsoportban. Uj adat.

Epilobium alpinum L. A Belli patak eredeténél, a Kriván-Fátrában, 1500 m. átlagos magasságban. Uj adat.

Bupleurum rotundifolium L. Biztosan előfordul a megyében. Valcsán, Zniováralján és Larán körül, a vetések között nő.

Bupleurum falcatum L. Zniováralján, a Várhegyen és Szlován körül, a Vricza partján.

Seseli annuum Ehrh. Zniováralján, a Várhegyen és a Hohlersteinon.

Scandix Pecten veneris L. A zniováraljai állomás körül, vetések között. Uj adat.

Chaerophyllum bulbosum L. Zniováralján, kertekben, keritések körül.

Falcaria Rivini Host. Az egész megyében szétszórtan nő a vetések mesgyéin. Tömegesebben Ábrahámfalva, Valcsa és Turóczvármegye körül. Uj adat.

Chimaphila umbellata Nutt. Zniováralján, a Horkiban.

Monotropa Hypopitys L. Zniováralja körül, árnyékos erdőkben, gyéren.

Sweertia perennis L. A Gagyeri-völgyben, Blatnicza mellett.

Convulvus sepium L. Ruttka és a Sztrecsényi-szoros között, Zniováralján, a Vricza partján.

Teucrium montanum L. Fábry a Nagy-Fátrából említi, előfordul a Kis-Fátrában is, és pedig Zniováralján, a Várhegyen és Vriczkó mellett, a Hohlersteinon.

Verbascum nigrum L. Zniováralja körül mindenütt.

Scrophularia Ehrharti Stev. Zniováralja mellett, a Vedzser tó környékén terem. Uj adat.

Veronica scutellata L. Dubova körül nedves, mocsaras réteken. Uj adat.

Euphrasia salisburgensis Funk. A Hohlersteinon, Vriczkó mellett.

Bartschia alpina L. VITKAY a Stochról, BORBÁS a Tlsztáról, WAGNER a Kis-Kriván magasabb csúcsairól említi. Terem a Klakon is, Vriczkó mellett.

Adoxa moschatellina L. A Szlováni-völgyben, a kénes forrás körül, a Valcsai-völgy északi hegyei között és Lazánban a Szteklács-féle kertben bőven.

Valerianella olitoria (L.) POLL. WAGNER a Vedzser tó környékéről említi. Terem még Znióváralján is, az intézeti és más kertekben.

Valerianella Morisonii SPRENG. Znióváralja, Ábrahámfalva, Valcsa és Turóczszentmárton körül, a vetések között bőven.

Adenostyles Kerneri SIMK. WAGNER a Nagy-Fátrából említi. Nő a Kis-Fátrában is a Klakon, Vriczkó mellett.

Aster alpinus L. Eddig a Tlsztáról és a Gagyeri-völgyből említették. A Kis-Kriván hegycsoporton is megtaláltam a Koncsita és a Kis-Kriván-csúcs közti nyergen, 1500 m. átlagos magasságban.

Inula Conyza DC. Znióváralján, a Vricza partján és a Vedzser-völgyben. Uj adat.

Inula ensifolia L. WAGNER egyedül Tlsztán szedte. Nő Znióváralján a Studineczen is.

Carlina longifolia REICHENB. A Vedzseri-völgyben, Znióváralja mellett. Uj adat.

Crepis praemorsa TAUSCH. A Várhegyen és a Jankován, Znióváralja mellett.

Ez alkalomból hálás köszönetet mondok DR. DEGEN ÁRPÁD, DR. GAYER GYULA és WAGNER JÁNOS uraknak, a kik adataimnak meghatározását és revideálását a legnagyobb készséggel vállalták el.

Verf. zählt in diesem Verzeichnisse die Ergebnisse zahlreicher während der Jahre 1904—1909 in die verschiedensten Teile des Komitates insbesondere in dem Turóczer Teil der Kleinen Fátra durchgeführter Excursionen auf. Die einzelnen Standorte sind aus dem ungar. Texte verständlich; bezüglich des von VITKAY für den Berg Stoch angegebenen *Astragalus alpinus* L. erwähnt der Verf., dass er gelegentlich speziell dem Aufsuchen dieser Art gewidmeter Excursionen sowohl auf dem Stoch, als auch auf dem Ostabhang des Kleinen Krivan von halbwegs ähnlichen Papilionaceen nur *Hedysarum obscurum* L. gefunden habe, dass es also höchst wahrscheinlich ist, dass VITKAY diese Pflanze für *Astr. alpinus* gehalten hat.

Pallas nyomda, Budapest.